

**A**

<b>Abdominal circumference (AC)</b>	окружность живота
<b>Active Labor</b>	Активный этап родов, когда шейка матки открывается от 4 до 10 см, а схватки идут каждые 2-5 минут
<b>Alpha-Fetoprotein test (AFP)</b>	Альфа-фетопротеин тест (АФП-тест), скрининг-тест на генетические отклонения плода
<b>Amniocentesis</b>	Амниоцентез, тест амниотической жидкости, на выявление генетических отклонений в развитии плода
<b>Amniotic Fluid</b>	Амниотическая жидкость
<b>Anterior presentation</b>	Головное предлежание плода, передний вид

**B**

<b>Back labor</b>	Спинные роды
<b>Biparietal diameter (BPD)</b>	Бипариетальный размер головки плода
<b>Braxton-Hicks Contractions</b>	Схватки Брэкстона-Хикса
<b>Breech Presentation</b>	Тазовое предлежание плода

**C**

<b>Cephalopelvic disproportion (CPD)</b>	Клинически узкий таз
<b>Cervical Incompetence</b>	Истмико-цервикальная недостаточность
<b>Cervical Ripening</b>	Смягчение и утончение шейки матки перед родами
<b>Cesarean Section (C-SECTION)</b>	Кесарево Сечение
<b>Circumsision</b>	Обрезание
<b>Chorionic Villus Sampling (CVS)</b>	Биопсия хориона
<b>Contractions</b>	Схватки
<b>Cord Compression</b>	Пережатие пуповины
<b>Cord Blood</b>	Пуповинная кровь
<b>Crowning</b>	Стадия родов, когда появляется и становится видна голова ребенка
<b>Crown rump length (CRL)</b>	копчико-теменной размер
<b>Cervix</b>	Шейка матки

**D**

<b>Delivery</b>	Роды
<b>Dilation</b>	Открытие шейки матки

<b>Dystocia</b>	Сложные, долгие роды
-----------------	----------------------

## Е

<b>Eclampsia (Toxemia)</b>	Эклампсия, высокое артериальное давление, которое появляется на сроке более 20 недель беременности
<b>Ectopic Pregnancy</b>	Внематочная беременность
<b>Effacement</b>	Постепенное утончение и сокращение шейки матки во время родов
<b>Embryo</b>	Эмбрион, плод до 8 недель беременности
<b>Episiotomy</b>	Эпизиотомия, хирургическое рассечение промежности во избежания разрывов во время родов
<b>External Version</b>	Мануальный переворот ребенка из тазового в головное предлежание

## Ф

<b>Failure to progress</b>	Сложные или остановившиеся роды
<b>Femur length (FL)</b>	длина бедренной кости
<b>Fetal Distress (Non reassuring Fetus Status)</b>	Когда ребенок не шевелится какое-то время или у него замедленное сердцебиение. Может указывать на недостаток кислорода
<b>Fetus</b>	Плод, с 8 недели до рождения
<b>Forceps Delivery</b>	Наложение щипцов во время родов
<b>Full Term</b>	Ребенок рожденный с 37 по 40 недели

## Г

<b>Gestational Age</b>	Возраст ребенка измеряемый с первого дня последней менструации матери
<b>Gestational Diabetes</b>	Диабет, который возникает во время беременности, и обычно проходит после родов

## Н

<b>Head circumference (HC)</b>	окружность головы
<b>Hyperemesis Gravidarum</b>	Гиперемезис беременных, сильная тошнота и рвота

## И

<b>Induction</b>	Стимуляция родовой деятельности
------------------	---------------------------------

## К

<b>Kick Count</b>	Подсчет количества движений малыша за определенный период, на поздних сроках беременности
-------------------	---

**L**

<b>Labor stages</b>	Этапы родов: 1. С момента начала схваток до полного раскрытия шейки матки 2. Вытуживание ребенка 3. Рождение плаценты
<b>Lightening</b>	Перемещение ребенка в малый таз на последних неделях беременности. После чего наступает облегчение дыхания матери
<b>Linea Negra</b>	Темная полоска, которая может появиться во время беременности на животе от лобковой кости до пупка
<b>Lochia</b>	Вагинальные выделения после родов
<b>Low Birth Weight</b>	Ребенок, родившийся весом менее чем 2.5 кг

**M**

<b>Miscarriage</b>	Выкидыш
--------------------	---------

**N**

<b>Nasal bone length</b>	длина носовой кости
<b>Neural-Tube Defect</b>	Дефект нервной трубки
<b>NT measurement (NT)</b>	толщина воротникового пространства
<b>Nuchal Translucency Test</b>	Ультразвуковое обследование плода (воротниковой зоны на признаки болезни Дауна)

**O**

<b>Obstructed Labor</b>	Роды, которые замедлились или остановились
<b>Occipitofrontal diameter (OFD)</b>	Лобно-затылочный диаметр
<b>Oxitocin (Pitocin)</b>	Окситоцин, средство, используемое для стимуляции родовой деятельности
<b>Obstetrician</b>	Гинеколог

**P**

<b>Perineum</b>	Область между влагалищем и анусом, разрез этой зоны во время родов называется эпизиотомией
<b>Placenta</b>	Плацента
<b>Placental Abruptio</b>	Отслоение плаценты
<b>Placenta Prevail</b>	Предлежание плаценты
<b>Posterior Presentation</b>	Положение, при котором ребенок лежит затылком к спине матери.
<b>Post-Term Pregnancy</b>	Беременность, которая длится более 42 недель
<b>Preeclampsia</b>	Преэклампсия

<b>Premature Baby</b>	Ребенок, рожденный до 37 недели
<b>Preterm Labor</b>	Роды, которые начинаются после 20 недели, но до 37 недели беременности
<b>Prolapsed Cord</b>	Выпадение пуповины во время родов. Может повлиять на подачу кислорода ребенку

## Q

<b>Quickening</b>	Когда мама впервые ощущает шевеление ребенка. Обычно происходит между 18 и 22 неделями
-------------------	--

## R

<b>Rapture of membranes (breaking of waters)</b>	Разрыв плодных оболочек до или во время родов
--	---

## S

<b>Show (Bloody show)</b>	Кровянистые выделения перед родами
---------------------------	------------------------------------

## T

<b>Transition Stage</b>	Стадия родов, когда шейка открыта от 8 до 10 см
<b>Transverse Lie</b>	Поперечное положение плода в матке
<b>Trimesters</b>	Триместры: 1 – до 14 недель; 2 с 14 до 27 недели; 3 с 27 до 40 недели беременности

## U

<b>Ultrasound (Sonogram)</b>	Ультразвук
------------------------------	------------

## V

<b>Vacuum Extraction</b>	Вакуумная экстракция, извлечение ребенка во время родов
--------------------------	---

**Этот словарь является моей интеллектуальной собственностью.**

**Пожалуйста, не распространяйте его, и не публикуйте в интернет.**

**Словарь будет обновляться и добавляться. Обновленная версия Словаря будет высылаться Вам на e-mail.**